

## Gonorrhoea

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog  
subota, 27 jun 2009 20:49 - Poslednje ažurirano subota, 27 jun 2009 21:26

---



Gonoreja je najčešća polna bolest koju izaziva bakterija koja se zove *Neisseria gonorrhoeae*. Ova bakterija se lokalizuje na epitelu sluznice uretralnog kanala i tu izaziva gnojnu upalu.

### Gonoreja muškaraca

#### Urethritis gonorrhoea acuta anterior

Poslije inkubacije od 3-5 dana oboljeli osjeća žarenje prilikom mokrenja. Iscjedak je u početku bezbojan nakon kratkog vremena postaje gnojan., obilan, žuto-zelene boje i spontano kapa iz uretralne cijevi.

Uretralno ušće je inflamirano i edematozno a vrlo često je prisutna i perigenitalna bol. Regionalni limfni čvorovi su uvećani i bolni naročito na palpaciju.

Ukoliko se oboljenje ne liječi i dođe do širenja infekcije na limfne puteve, tada se javlja otok polnog organa uz povišenu temperaturu. Ukoliko se oboljenje ne liječi inflamacija se širi uz pogoršanje opšteg stanja oboljeloga.

#### Urethritis gonorrhoea posterior

U ovom stadijumu oboljenja izražena je potreba za učestalim mokrenjem, učestalim i bolnim senzacijama perigenitalno, a karakteristično je pečenje na kraju mokrenja.

## Gonorrhoea

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog  
subota, 27 jun 2009 20:49 - Poslednje ažurirano subota, 27 jun 2009 21:26

---

Urin je mutan, zbog prisustvo gnoja, a na kraju mokrenja se pojavljuje krv u urinu. Oboljeli u ovom stadijumu oboljenja osjeća bolove u perineumu koji se šire prema rektumu, a u koliko se ne liječi oboljenje prelazi u hronični oblik.

Urethritis gonorrhoeica chronica

U ovom stadijumu subjektivni simptomi oboljenja su blaži a znaci upale slabije izraženi.

Znaci upale su minimalni a ogledaju se u jednoj zamućenoj kapi sadržaja iz uretre prije mokrenja, uglavnom juternjeg.

Na žalost ovakvo stanje može trajati mjesecima, a da oboljeli nije svjestan prirode svoje infekcije. Tokom cijelog ovog perioda oboljeli je INFEKTIVAN, a da toga nije svjestan, pa mijenjajući polne partnere dolazi do širenja infekcije.

Komplikacije kod gonoreje, na sreću danas su rijetka upravo zbog pravovremenog liječenja, ali ako se ono ne primjeni na vrijeme, dolazi do oboljenja prostate i sjemenih kanalića.

Prostata je uvećana, bolna na palpaciju, bolesnik osjeća bolove u donjem dijelu stomaka i rektumu i temperatura je vrlo često povišena.

## **Gonorrhoea**

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog  
subota, 27 jun 2009 20:49 - Poslednje ažurirano subota, 27 jun 2009 21:26

---

Ukoliko je nastao epididimitis, temperatura je uglavnom povišena, oboljeli osjeća bol u ingvinalnim regijama, a ako se razvije obostrani epididimitis, u skoro 90% slučajeva nastaje aspermija.

## **Gonoreja kod žena**

Ovo oboljenje kod žena je ozbiljnije prirode nego kod muškaraca. Nakon infekcije sa gonokokom ono u početku zahvata samo uretralni kanal i cervikalni kanal.

Tegobe su manje izražene zbog kraće uretralne cijevi, tako da žene ne traže pomoć doktora, a gonokokna infekcija za to vrijeme ide uzlaznim putem u više dijelove genitalnog trakta. Za sve to vrijeme oboljela žena je INFEKTIVNA, a postupalne promjene na jajovodima i jajnicima dovode do steriliteta.

U akutnoj fazi oboljenja žena osjeća svrbež i pečenje, ima učestalo mokrenje i serozno-gnojan iscjedak. U hroničnoj fazi osobe su infektivne kako za svoje partnere tako i za svoju djecu, uz stalnu opasnost od trajnih komplikacija.

Komplikacije od gonoreje kod žena su česte, a to su: upala Bartolinijevih žlijezda, upala jajovoda koja skoro u svim ne liječenim slučajevima završava sterilitetom, zatim upala endometrija, a kao posledica je i pojava polnih bradavica.

Liječenje je u domenu dermatovenerologa i ginekolog