


Alopecia areata (Opadanje kose)

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog

petak, 11 septembar 2009 11:36 - Poslednje ažurirano petak, 11 septembar 2009 13:00



Postoji normalno fiziološko ispadanje dlaka sa kapilicija, koja može da bude različitog inteziteta ovisno o godišnjem dobu i psihološkim situacijama koje prolazi pojedina osoba i ta kosa se normalno nadomjesti novim rastom.

Za razliku od normalnog opadanja kose postoje i različita patološka opadanja koja se mogu podijeliti u više grupa. Jedan od patoloških gubitaka kose je i Alopecia areata, koja se karakteriše ispadanjem dlaka u obliku ovalnih ili okruglih, jasno ograničenih ploča različite veličine i broja, kako na kosmatom dijelu glave, tako i na bradi kod muškaraca koji se briju.

Oboljenje može biti genetski uslovljeno, a psihološki stres može djelovati kao precipitirajući faktor. U novije vrijeme se isključuje infekcija i oboljenja drugih organa. Ovo oboljenje može da se pojavi kod osobe koje imaju genetsku predispoziciju za atopijski dermatitis i tok liječenja ove alopecije je nešto duži.



Kod ovoga oblika alopecije bitno je naglasiti da kod nekih oblika postoje očuvani folikula iz kojih nakon nekog vremena izraste nova i zdrava dlaka tako da dolazi do potpunog izlječenja. Prvi znaci oboljenja se mogu javiti u svakom dobnom uzrastu, međutim, najčešće se promjene javljaju do tridesete godine života, sa tendencijom češće pojave kod osoba ženskog pola. Oboljenje počinje gubitkom kose u pečatima na kapiliciju, kao i na bradi kod muškaraca, a na tim regijama dlake su u cijelosti izgubljene a koža je bijela sa tendencijom širenja promjene bez kose ka okcipitalnoj regiji uz lako čupanje dlaka sa ruba promjene.

Alopecia areata (Opadanje kose)

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog

petak, 11 septembar 2009 11:36 - Poslednje ažurirano petak, 11 septembar 2009 13:00

Razlikujemo nekoliko oblika alopecije a najčešće susrećemo:

Alopeciju totalis, kod koje je nastao gubitak kose se kapilicija u cijelosti, **Univerzalnu alopeciju**, kod koje nedostaju dlaka na kapiliciju, obrve, trepavice, aksilarne i pubične dlake kao i velus dlake.

Vrlo često totalnu alopeciju se kod oboljelih mogu naći promjene na nokatnim pločama, a koža je suha uz izražen svrab nakon tuširanja. Ako se radi o lakšem obliku oboljenja kosa poraste za nekoliko mjeseci dok za teže oblike potrebno je duže i sistematičnije liječenje uz psihološku pripremu oboljelih.